

疫情
播报

福建确诊
120例

9月10日至9月14日8时,福建省累计报告新冠肺炎本土确诊病例120例(莆田市75例、泉州市12例、厦门市33例),本土无症状感染者19例(均在莆田市)。目前,确诊患者、无症状感染者均已转至定点医院收治,无重症患者。

据新华社

4天139例阳性感染者 福建疫情凸显3个问题

“坚决遏制疫情蔓延。”面对9月10日以来发生的本土疫情,福建官方如是喊话。

福建疫情防控形势复杂严峻。仅仅4天时间,福建已累计报告本土阳性病例139例,显示疫情传播链还在延长。

问题一

有着怎样的传播链?

截至9月14日11时,厦门市累计报告新冠肺炎确诊病例35例,无症状感染者1例。厦门市副市长廖华生说,9月13日18时后新增的23例确诊病例,均为厦门现有确诊病例的密切接触者,其中22例是该市首例确诊病例吴某某同一工厂的同事,另一例是吴某某的女儿。

9月12日,厦门市报告首例病例吴某某,系莆田确诊病例的密切接触者。目前,吴某某所在工厂确诊病例33例,均为吴某某同一工厂的密切接触者,属于同一传播链条。

而在此次福建本土疫情的始发地,莆田市仙游县已形成铺头小学、协胜鞋厂两条传播链。

仙游县枫亭镇铺头小学是此次疫情最早发现病例的地方。从莆田市卫健委公布的病例详情可见,截至12日0时,铺头小学的聚集性疫情,已导致18名小学生感染。

位于枫亭镇内的协胜鞋厂是另外一个集中传播点。莆田市卫健委发布的病例详情显示,9月11日新增的36例感染者中,有8例为该鞋厂员工;9月12日新增的28例感染者,有12例为该鞋厂员工。而据泉州市官方披露,截至9月12日24时,泉州累计报告的确诊病例7例中,他们均与莆田疫情相关联,4例都是该鞋厂员工。

因为这两条传播链,疫情已由莆田波及泉州、厦门。莆田市卫健委主任姚冰珊当天接受中新社记者采访时表示,莆田目前采取的措施主要是加强区域协查管控和推进核酸检测。

国家卫健委派出的赴福建工作组专家研判,只要确保各项措施和各个环节落到实处,疫情规模有望在国庆长假前得到控制。



9月14日,在厦门五一文化广场核酸检测点,工作人员为市民进行核酸采样。
新华社记者 姜克红 摄

问题二

还会有多少感染者被检出?

经专家初步研判,此次疫情源头疑似为新加坡入境人员林某杰导致的传染链条,病毒基因为德尔塔毒株。

这一次,狡猾的“德尔塔”不仅有着超长潜伏期,而且传播速度快,传染力强。短短4天内,福建本土确诊病例就已突破百例。

9月14日起,仙游县启动第二轮全员核酸检测,莆田市、厦门市

和泉州市惠安县也启动全员核酸检测。仙游县县长吴海端说,专家判断,要经过三轮以上全员核酸检测,根据结果再进行判断,目前形势比较严峻。

随着核酸检测范围的扩大、流调溯源的全力推进,福建料将有更多感染者被检出。据福建省卫生健康委员会通报,目前,福建尚有密切接触者3597人正在接受医学观察。

问题三

如何为孩子撑起更好的“保护伞”?

小学、幼儿园低龄儿童感染较多是此次福建疫情的一个突出特点。记者盘点官方通报注意到,此次疫情至少已涉及铺头小学、南大门幼儿园、启蒙幼儿园、枫亭中心小学、前埔小学、枫江中学、界山小学等7所学校。

仙游县应对新冠肺炎疫情工作组指挥部副指挥长、县委常委黄少敏透露,截至9月13日24时,莆田市累计报告85例阳性病例中,学生36人,其中幼托儿童8人、小学生28人,10岁以下的30人。

应对学校疫情的集中传播,厦门、莆田等地所有中小学、幼儿园已经停课,线下教学转为线上教学。福建要求各级各类学校全体

师生员工进行核酸检测。

赋予校园学生身心“安全感”,成为当下战“疫”中的一道新课题。仙游县教育部门正对教师群体进行培训,倡导教师在线上授课中兼顾关注学生情绪。仙游一所中学的数学教师张建新对记者说,此番疫情就在身边,对学生冲击不一样,还是需要特别关注。

对于低龄患者的隔离管控,吴海端表示,在防止交叉感染的前提下,管控中要体现人文的关怀。“给他课外读物,让他放松。如果孩子能独立隔离,就单独隔离;如果需要父母在旁边陪伴,那么我们就把他的父母安排在另外一个房间,可以聊天。”
中新网记者 龙敏

新版全员核酸检测 组织实施指南出台

为有效应对新冠病毒德尔塔变异株可能引起的疫情,进一步提升全员核酸检测组织实施能力,国务院联防联控机制综合组近日印发《全员新型冠状病毒核酸检测组织实施指南(第二版)》。

核酸检测是新冠病毒感染防控的重要手段。据悉,本指南旨在为各地做好大规模人群新冠病毒核酸检测各项准备工作提供指导,确保在规定时间内保质保量完成划定区域范围内全员核酸检测任务,实现“早发现、早隔离、早诊断、早治疗”。

指南提出,要根据疫情传播趋势,以风险为导向,精准划定核酸检测范围,确定核酸检测策略。疫情前期,在风险来源不明的情况下应至少开展3轮全员核酸检测;之后根据流调溯源情况、社区封控范围、核酸检测结果等综合研判,确定后续的检测范围和频次。原则上,隔离点和近3轮核酸检测出现过病例的街道或社区每日一检,14天内出现过病例但近3轮核酸检测没有出现病例的街道或社区隔日一检,14天内未出现病例的地区可每5天一检。

对于隔离点及其他重点人群,指南要求应单采单检,封闭小区(封闭到户)1户1管,其他地区根据实际情况采取5混1或10混1开展检测。

同时,各地应当综合人口数量、地缘交通、核酸检测机构分布等情况,科学规划采样点布局。采样点应当在4-6小时内完成规范建设和启用,在固定采样点的基础上,采取网格化管理模式。严格落实“1米线”间隔要求,保证居民排队时间不超过30分钟,严防人员聚集,避免交叉感染。60岁以上老年人、孕妇、残障等弱势群体应设置绿色通道独立采样。

此外,指南明确,检测结果应当及时上报,重点地区重点人群6小时、其他人群12小时,原则上不得超过24小时。
新华社记者 沐铁城 邱冰清

这些人员要实行闭环管理

为进一步做好医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制工作,最大限度降低感染发生,国务院联防联控机制综合组近日印发《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南(第三版)》,要求对部分重点科室、部门工作人员实行闭环管理。

指南要求,对参与相关诊疗工作人员要加强管理,必要时,可集中封闭管理,并根据疫情流行情况和防控要求进行核酸检测,需要时可合理开展胸部CT、血常规、抗体检测等检验检查。收治新冠病毒感染者的隔离病区工作人员实行闭环管理。

针对发热门诊,指南明确,接诊入境、国内中高风险地区以及集中隔离点发热患者等高风险人群的发热门诊,所有工作人员要严格闭环管理。

对于收治新冠病毒感染者的定点医院及病区,指南要求,定点医院隔离病区所有工作人员(包括医务、管理、安保、保洁、餐饮、医疗废物收集转运等人员)及其他直接或间接接触新冠病毒感染者的工作人员(包括专门为新冠病毒感染者提供服务的影像学检查等医务人员、闭环管理工作人员的通勤司机等)应当严格实行闭环管理,工作期间安排单人单间集中居住,所有人员在驻地与定点医院间两点一线出行,固定通勤车辆,不得在定点医院内安排驻地。

指南表示,医疗机构应当合理调配人力资源和安排班次,优先保障隔离病区、发热门诊及核酸检测等重点部门的诊疗需求,医务人员相对固定,缩短可能暴露的时间,避免医务人员过度疲劳,提供营养膳食,保障医务人员充分休息。
新华社记者 徐鹏航 邱冰清

春城晚报

开屏新闻App

理想生活 即刻开屏

