



高黎贡山梨簕竹的开花周期估计长达47年

蛇头蛾现身陇川



乌桕大蚕蛾的翅膀顶端很像蛇头

“小心，那边有蛇。”近日，在德宏州陇川县清平乡一片桑园附近，路人被两只巨型飞蛾吓了一跳。仔细一看，“蛇”原来是两只正在交配的飞蛾，但较为特别的是，飞蛾翅膀顶端呈现蛇头模样，犹如两条大蛇正注视着周围。后经陇川县林业和草原局工作人员鉴定，这两只巨型飞蛾为乌桕大蚕蛾，别名为蛇头蛾、蛇头蝶。

乌桕大蚕蛾翅展可达180毫米至210毫米，有成年男人手掌大小。属于鳞翅目大蚕蛾科巨大蚕蛾属，是世界上体型较大的蛾类之一。乌桕大蚕蛾的前翅先端向外突出，形似蛇头，呈鲜艳的黄色。上缘还带有一枚黑色圆斑，宛如蛇眼，有恫吓天敌的作用。幼虫主要生活在乌桕、樟、柳、大叶合欢、小蘗、甘薯、狗尾草、冬青、桦木等植物上。

乌桕大蚕蛾主要分布于东南亚和中国境内，我国境内的数量较少，属于受保护的种类。2000年8月1日，乌桕大蚕蛾被列入国家林业局发布实施的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

陇川县林业和草原局相关负责人表示，近年来，陇川县持续加强生态环境保护力度，通过实施森林资源保护、野生动物栖息地修复等一系列措施，为珍稀物种的生存和繁衍提供了良好的生态环境。

本报记者 马楠 通讯员 段宗智 方雯青 摄影报道

铜壁关保护区发现竹类新种

8月19日，记者从中国科学院昆明植物研究所获悉，科研人员在位于高黎贡山区域的云南铜壁关省级自然保护区及邻近的缅甸北部地区，发现并正式命名了一个竹类植物新种——高黎贡山梨簕竹。

梨簕竹属植物的分类鉴定极具挑战，其开花周期长且极不规律，高黎贡山梨簕竹的开花周期估计长达47年，导致关键花果标本极为稀缺。

为确认在铜壁关等地发现的攀援竹类身份，研究人员长期开展野外跟踪监测，采集多份关键标本，并通过整合形态学比较与分子系统学分析，最终确认其为梨簕竹属新物种。

高黎贡山梨簕竹具有梨簕竹属典型特征，如攀援、匍匐习性，地下茎合轴丛生。该物种主要分布在云南铜壁关省级自然保护区及邻近的缅甸北部地区，常生长于斜坡边或溪流附近。梨簕竹属植物多见于季节性雨林和季风常绿阔叶林中，常出现在林缘或干扰形成的林窗，其分布或能对生态系统健康状况提供指示。

高黎贡山梨簕竹的发现不仅丰富了区域物种名录，为探索区域植物多样性奠定了基础，也为重新评估高黎贡山这一生物多样性热点区域的保护状况提供了新的依据。

本报记者 杨质高 实习生 热孜完古丽 文
通讯员 许祖昌 刘泾霞 摄

冬候鸟到拉市海“避暑”

近日，丽江拉市海湿地出现了多种冬候鸟前来“避暑”的罕见景象。

清晨，薄雾尚未完全散尽，拉市海广阔的湖面泛着微光，丽江市拉市海高原湿地省级自然保护区管护局的巡护员如往常一样开始了监测工作。当望远镜扫过一片浅水区时，镜头里赫然映入了不同寻常的景象：9只灰雁在湿地里安然游弋，在它们的不远处，2只优雅的钳嘴鹳、2只羽色斑斓的彩鹳以及3只黑颈鸬鹚在悠然觅食。

按照多年观测记录，灰雁一般在10月初才会从遥远的北方飞来越冬，但今年7月它们便出现在拉市海高原湿地。更难能可贵的是，工作人员还发现了钳嘴鹳、彩鹳、黑颈鸬鹚光顾此地。

“这些鸟儿，特别是灰雁群在夏季到来绝不是偶然的惊喜。”一位常年与湿地为伴的保护区工作人员凝视着湖面说，“它们是检验湿地生态健康的晴雨表。当本该深秋才见的候鸟提前到来，就证明这里的生态已经适宜鸟类长期生存，这也是大自然颁发给拉市海最权威、最动人的勋章。”

本报记者 李铁成
通讯员 张小秋 杨向红 摄影报道



彩鹳立枝头



高黎贡山梨簕竹具有攀援、匍匐习性